

～売れる「新潟なんかん米」づくり運動～

売れる米緊急技術情報

号 外

低温で、幼穂形成が遅れています！

～今後の天候によって、

さらに遅れることも予想されます～

平成19年7月20日
JAにいがた南蒲
三条農業普及指導センター

1 コシヒカリの出穂期予想（7月19日現在）

移植時期	1回目穂肥時期	2回目穂肥時期	出穂期
5月6日植	7月20～23日	7月28日	8月7日
5月10日植	7月22～25日	7月30日	8月9日

◆ほ場内・ほ場間により、生育のバラつきが見られますので幼穂長を必ず確認（診断）して、“売れる米づくり穂肥診断必勝盤”（円盤）を活用して適期に穂肥を施用しましょう。

2 コシヒカリの穂肥

1回目

○まだ施用していないほ場

幼穂長1cmを確認してから施用しましょう。（量：窒素成分1.0kg/10a）

2回目

○早い対応にならないよう注意して施用しましょう（後期栄養維持）

幼穂長10cm程度を確認し、確実に2回目の穂肥を施用しましょう。

3 病虫害防除

①いもち病

・いもち病の好適条件が続いています。特に、コシヒカリ以外の品種では葉色が濃いので発生に注意しましょう。

②カメムシ

・カメムシ類の増殖を抑えるため、継続した畦畔・農道の草刈りを徹底しましょう。